

INVOKANA® کے ساتھ شروعات کرنا

INVOKANA® غذا اور ورزش کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے...

ٹائپ 2 ذیابیطس والے بالغوں میں:

« بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے

ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض اور دل کی بیماری کے زیادہ خطرے کی

زد میں بالغوں میں مندرجہ ذیل خطرات کو کم کرنے کے لیے:

« آپ کے دل یا خون کی نالیوں سے متعلقہ حادثات میں موت

« غیر مہلک دل کے دورے پڑنا

« غیر مہلک فوج ہونا

ٹائپ 2 ذیابیطس اور ذیابیطس کی وجہ سے گردوں کے مریض بالغوں

میں مندرجہ ذیل خطرات کو کم کرنے کے لیے:

« گردوں کے فضل کا اس حد تک خراب ہو جانا جہاں آپ کے گردے ناکارہ ہو جائیں اور آپ

کو ڈائلیزس کی ضرورت پڑے

« آپ کے دل یا خون کی رگوں میں متعلق حادثات میں موت



**INVOKANA**  
canagliflozin tablets



## INVOKANA® ٹائپ 2 ذیابیطس میں

ٹائپ 2 ذیابیطس ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کا جسم مناسب انسولین نہیں بناتا، اور / یا آپ کا جسم جو انسولین بناتا ہے اسے اتنی اچھی طرح استعمال نہیں کرتا جتنا اسے کرنا چاہئے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو، شوگر خون میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

ٹائپ 2 ذیابیطس والے بالغوں میں غذا اور ورزش کے علاوہ INVOKANA® کو بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے:

- << تہا، ان لوگوں میں جو میٹھا مین نہیں لے سکتے
- << میٹھا مین کے ہمراہ
- << سلفونی لوریہ کے ہمراہ
- << میٹھا مین اور سلفونی لوریہ کے ہمراہ
- << میٹھا مین اور پیوگلمنازون کے ہمراہ
- << میٹھا مین اور سیناگلیسٹن کے ہمراہ
- << انسولین کے ساتھ (میٹھا مین کے ہمراہ یا بغیر)



اگر آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے اور آپ کے دل یا خون کی نالیوں کی وجہ سے صحت کے مسائل ہیں (یا ہو سکتے ہیں) تو، INVOKANA® کو اپنے مندرجہ ذیل کے خطرے کو کم کرنے کے لئے غذا اور ورزش کے ہمراہ استعمال کیا جاسکتا ہے:

- << متعلقہ حادثات سے موت
- << کوئی غیر مہلک دل کے دورے پڑنا
- << غیر مہلک فالج ہونا



اگر آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے اور آپ کی ذیابیطس کے نتیجے میں آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں تو، INVOKANA® کو اپنے مندرجہ ذیل خطرے کو کم کرنے کے لئے غذا اور ورزش کے ہمراہ استعمال کیا جاسکتا ہے:

- << گردے کے فعل کا اس حد تک خراب ہو جانا جہاں
- << گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈائلیزس کی ضرورت موت واقع ہونا
- << آپ کے دل یا رگوں سے متعلقہ امراض سے

ہوتی ہے



اپنے دن کی شروعات INVOKANA® کے ساتھ کریں  
INVOKANA® کو دن میں ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ:

<< صبح ناشتے سے پہلے لیں INVOKANA®

<< دوا کو پانی کے ساتھ نگل لیں

<< کوشش کریں کہ روزانہ ایک ہی وقت پر لی جائے

INVOKANA® کو کھانے کے ہمراہ یا بغیر لیا جا سکتا ہے۔ معمول کی ابتدائی خوراک 100 ملی گرام ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی خوراک میں 300 ملی گرام تک اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو گردے کی خرابی کا مرض ہو تو آپ کی خوراک 100 ملی گرام ہی تک رہ سکتی ہے۔ INVOKANA® شروع کرنے سے پہلے، آپ کا ڈاکٹر یہ دیکھنے کے لیے ٹیسٹ کرائے گا کہ آپ کے گردے کتنے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔

اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ کو ان کسی بھی ادویات یا بغیر نسخے کے ملنے والی مصنوعات کے متعلق بتائیں جو آپ لے رہے ہیں، حال ہی میں لے چکے ہیں، یا لے سکتے ہیں۔ INVOKANA® دیگر ادویات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بشمول

<< ڈائجوسٹک، ایک دوا جو دل کے مسائل کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہے

<< انسولین یا ایک سلفونا نیلوریا (جیسے گلیسیمپرائڈ، گلیکزیپرائڈ، یا گلیکپرائڈ)

<< فیوروسیمائڈ یا دیگر ڈیپریکس (پانی کی گولیاں)

<< کاربانائڈ پائٹن، فینیسٹون، یا فینوباربٹل

<< انٹیوٹینسن بدلنے والا بنجام (ACE) روکنے والا یا انٹیوٹینسن رسیپٹر بلاکر (اسے آر بی) (آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے)

<< ایسیورنز یا رتادور

<< ریفاپین

<< سینٹ جانز وارٹ



INVOKANA® کس طرح کام کرتی ہے

INVOKANA® آپ کے جسم سے شوگر کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے

عام طور پر، گردوں سے شوگر کو فلٹر کیے جانے کے بعد، اس کا تقریباً سارا حصہ خون میں (دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے) دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔ INVOKANA® پیشاب کے راستے نکل جانے والی شوگر کی مقدار میں اضافہ کر کے شوگر کی اس مقدار کو کم کرتی ہے جس کو جسم میں واپس جانے کی اجازت ہوتی ہے۔

کم شوگر خون میں  
واپس ڈال دی

زیادہ شوگر  
پیشاب میں نکل گئی

گردہ


شوگر گردے  
میں جاتی ہے

Invokana

شوگر

خون

پیشاب





**INVOKANA®** کے دو بہت عام مضر اثرات کا بندوبست کرنے میں مدد

کی حکمتِ عملیاں

جیسے کسی بھی دوا میں ہوتا ہے، آپ کو INVOKANA® لیتے ہوئے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سلفونا نیلوریا یا انسولین کے مرکب لینے والے افراد کی بلڈ شوگر کم ہو سکتی ہے (جسے "ہائپوگائسیمیا بھی کہا جاتا ہے) INVOKANA® سے بھی اندام نہانی میں خمیر بننے کا انفیکشن ممکن ہیں۔ اگر آپ کو ان مضر اثرات کی علامات نظر آئیں تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ کو بتائیں۔

خمیر بننے کے انفیکشنز سے بچنے میں مدد کے لیے تجاویز:

<< سوئی انڈریمر پہنیں۔

<< جتنی جلدی ہو سکے، گلیکے کپڑے، جیسے سوئمنگ سوٹ یا ورزش والے کپڑے تبدیل کریں۔

<< گرم ٹیوں اور بہت گرم حماموں سے دور رہیں۔

اندام نہانی میں خمیر بننے کے انفیکشن کی علامات میں اندام نہانی کی بدبو، سفید یا پیلے رنگ کی رطوبت کا اخراج، اور/یا خارش ہونا شامل ہیں۔

اگر آپ کی بلڈ شوگر کم ہو جائے تو کیا کرنا ہے:

1. تیزی سے عمل کرنے والے (15 گرام) کاربوہائیڈریٹ کھائیں یا پیئیں، جیسے کہ شہد کا 1 کھانے کا چمچ، 6 LifeSavers®، یا 150 ملی لیٹر جوس یا سافٹ ڈرنک۔

2. 15 منٹ تک انتظار کریں پھر بلڈ شوگر چیک کریں۔ اگر بلڈ شوگر اب بھی کم ہے

(4.0 mmol/L سے کم)، ان 2 مراحل کو دوہرائیں

3. جب آپ کی بلڈ شوگر 4.0 mmol/L سے زیادہ ہو جائے، تو اگر آپ کے اگلے کھانے کا وقت ایک گھنٹے کے اندر اندر نہ ہو تو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھالیں جس میں پروٹین اور نشاستہ دونوں شامل ہوں (جیسے کہ پیئر کا ایک ٹکڑا اور 7 بسکٹ)۔

بلڈ شوگر کم ہونے کی علامات میں کچھ ٹھنڈی طاری ہونا، پسینہ آنا، رنگ پتلا پڑ جانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، ٹھیک نظر نہ آنا، بھوک لگنا، سردرد، مزاج میں تبدیلی، اور بے چینی یا اضطراب کا احساس شامل ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ اگر آپ سلفونا نیلوریا یا انسولین بھی لے رہے ہیں تو شوگر کم ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔



## INVOKANA® کے دوسرے ممکنہ مضر اثرات

اگر آپ کو مندرجہ ذیل دیگر ممکنہ مضر اثرات محسوس ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ سے بات کریں:

### عام مضر اثرات

- << عضو تناسل میں خمیر بننے کی انفیکشن (سرخی، سوجن، عضو تناسل کے سرے (قشعہ) میں خارش؛ غیر نختہ شدہ جھلی کے نیچے ڈلی دار مواد کا اخراج؛ بدبو؛ پیشاب کرتے وقت یا مباشرت کے دوران تکلیف ہونا)
- << پیشاب کی نالی میں انفیکشن (پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس؛ کمر یا درمیانی پیٹھ میں درد، پیشاب کے تقاضے میں اضافہ)
- << قبض
- << بڈی فریکچر (ٹوٹی ہوئی ہڈیاں)
- << جلد کے السر جلد پھسنا یا زخم بن جانا، زیادہ تر ٹانگ کے نچلے حصے میں

### غیر معمولی مضر اثرات

- << رگوں کا بند یا تنگ ہونا، جسے "پیریفیرل اسکیمیا" کہا جاتا ہے (چلتے وقت ٹانگ میں درد جو آرام کرنے پر ٹھیک ہو جاتا ہے؛ خون کے دورے کی خرابی؛ رنگت کا نیلا، سرد پڑ جانا؛ ناکھوں اور بالوں کی خراب نشوونما)
- << پانی کی کمی (بہت پیاس، کمزوری، یا تھکاوٹ محسوس کرنا؛ پیشاب کم آنا یا بالکل نہ آنا؛ دل کی تیز دھڑکن)
- << کم بلڈ پریشر (چکر آنا، بے ہوشی، یا ہلکا پن یہ اس وقت محسوس ہو سکتے ہیں جب آپ لیٹنے کے بعد بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہیں)
- << گردوں کے مسائل (متلی؛ تھقے؛ دست؛ پٹھوں کا چڑھنا؛ ٹانگوں، ٹخنوں، پاؤں، چہرے، اور/یا ہاتھوں میں سوجن، سانس اکھڑنا، پیشاب کی کثرت اور رنگت اور مقدار کا تبدیل ہونا)

INVOKANA® لیتے ہوئے اگر آپ کی جلد پر سرخ نشانات پڑ جائیں یا چھپاکی نکل آئے (ایک غیر معمولی مضر اثر) تو، اسے لینا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ سے رابطہ کریں۔ لبلے کی سوزش (ایک شاذ و نادر ہونے والا مضر اثر جسے "چین کریٹیمیٹ" کہا جاتا ہے، ایسی علامات کے ساتھ جن میں شامل ہے شدید پیٹ درد جو دیر تک رہتا ہے اور جب آپ لیٹتے ہیں تو، اور شدید ہو جاتا ہے، متلی، تھقے ہونا) اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ کو فون کرنے کی ایک اور وجہ ہے۔

اگر آپ کو کسی ایسے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، یا اگر آپ کو ایک بڑی سرجری، سنگین انفیکشن، یا سنگین ٹیٹی بیماری کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے تو بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہئے۔

## اہم حفاظتی معلومات

### INVOKANA® لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ سے بات کریں اگر آپ:

- << میں ذیابیطس کیٹوسائیزڈوس (یا "DKA"، ذیابیطس کی ایک پیچیدگی) پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے، بشمول اگر آپ:
  - کے بدن میں پانی کی کمی ہے یا ضرورت سے زیادہ تھکے، دست، یا پسینہ آ رہا ہے؛
  - بہت کم کاربوہائیڈریٹ والی غذا پر ہیں؛
  - کچھ دیر سے روزے رکھتے رہے ہیں؛
  - کم کھا رہے ہیں، یا آپ کی غذا میں کوئی تبدیلی ہے؛
  - بہت شراب پیتے ہیں؛
  - آپ کے لیبلے میں کوئی مسائل ہیں یا یہ چکے ہیں؛
  - بڑی سرجری، سنگین انفیکشن، یا سنگین طبی پیاروں کے لئے اسپتال میں داخل ہیں یا کوئی بڑی سرجری ہونے والی ہے؛
  - بہت جلد ظاہر ہونے والی کوئی بیماری ہے؛
  - انسولین کی خوراک میں اچانک کمی آئی؛
  - ذیابیطس کی وجہ سے گردے کی بیماری ہے؛
  - (DKA) کی ایک تاریخ رہی ہے۔

### << کے قطع عضو کی ضرورت کا امکان بڑھ جاتا ہے، بشمول اگر آپ:

- کی قطع عضو کی ایک تاریخ رہی ہے؛
- میں دل کی بیماری ہو یا دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہو؛
- کی رگیں بند یا تنگ ہو گئی ہیں، عموماً ٹانگ کی؛
- کی ٹانگ کے اعصاب کو نقصان پہنچا ہے؛
- کے پاؤں میں السر یا زخم ہیں جو ذیابیطس کے مریضوں کے پاؤں میں ہو جاتے ہیں؛
- کے نچلے دھڑ میں انفیکشن ہے؛
- کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔

<< کا بلڈ پریشر کم سے رہا ہے (جس کو "ہائپوٹینشن" بھی کہا جاتا ہے) اور آپ اپنے جسم سے فالتو پانی نکالنے کے لیے ادویات لے رہے ہیں (جنہیں "ڈیورٹکس" یا پانی کی گولیاں کہتے ہیں) یا اپنا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے ادویات (جیسے کہ اینٹیہیپٹن بدلنے والے ازانام روکنے والے یا اینٹیہیپٹن ریپینر بلاکرز) لے رہے ہیں۔ ان دواؤں میں سے کسی کے ساتھ INVOKANA® استعمال کرنے سے پانی کی کمی اور / یا کم بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے

<< کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے

<< اپنے بلڈ شوگر کو کم کرنے کے لیے دوائیں لے رہے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے وقت یا بھاری مشینری استعمال کرتے وقت بلڈ شوگر کم ہونے کے امکان سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں

<< درد کا علاج کرنے اور سوزش اور بخار کو کم کرنے کے لئے استعمال ہونے والی دوائیں لے رہے ہیں (جسے غیر سٹرائڈس اینٹی سوزش دوائیں یا "NSAIDs" کہا جاتا ہے)۔ INVOKANA® کو ان دوائیوں کے ساتھ لینے سے گردوں کے مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے

<< کو جگر کے مسائل ہیں

<< کو دل کے مسائل ہیں

<< دودھ میں پانی جانے والی کچھ شکر کو برداشت نہیں کرتے۔ INVOKANA® گولیوں میں لیکٹوز ہوتا ہے

<< حاملہ ہیں یا بچہ پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ INVOKANA® کو حمل کے دوران استعمال نہیں کیا جانا چاہئے

<< دودھ پلاری ہیں۔ INVOKANA® کو دودھ پلانے کے دوران استعمال نہیں کیا جانا چاہئے

<< کی پیشاب کی نالی میں اکثر انفیکشن ہو جاتی ہیں



INVOKANA® کو 18 سال سے کم عمر افراد کے استعمال کے لیے تجویز نہیں کیا جاتا۔

شوگر (گلوکوز) کے لیے آپ کے پیشاب کا INVOKANA® ٹیسٹ مثبت آنے کا سبب بنے گی۔

INVOKANA® لینے سے آپ کی بڑی ٹوٹے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے ان عوامل کے بارے میں بات کریں جو آپ کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔

INVOKANA® لینے کے دوران، آپ کا ڈاکٹر گردے کے فعل، خون میں چربی کی سطح (کم کثافت لیپوپروٹین کولیسٹرول، یا "LDL-C")، خون میں سرخ خلیوں کی مقدار (ہیماٹوکریٹ) خون میں پوٹاشیم کی سطح کی جانچ پڑتال کے لئے خون ٹیسٹ کا حکم دے سکتا ہے۔

INVOKANA® ایک ایسی حالت کا سبب بن سکتا ہے جسے "پیرینیم کا نیکروٹائزنگ فاسیائٹس" (مقعد اور اعضائے تولید کے درمیان اور اس کے آس پاس کا علاقہ) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شاذ و نادر ہونے والی، لیکن سنگین، ممکنہ طور پر جان لیوا انفیکشن ہے جو مرد اور عورت دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسے "فورٹیر گینگرین" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے لئے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اعضائے تولید یا اعضائے تولید سے متصل حصے میں تکلیف، لالی، یا سوجن محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پر تب آپ کو بخار بھی ہے یا آپ کو بہت کمزوری، تھکاوٹ، یا تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو فوری طور پر طبی امداد طلب کریں۔ یہ فورٹیر گینگرین کی علامات ہو سکتی ہیں۔

اگر آپ سرجری کروانے چاہتے ہیں اور آپ کی سرجری کے بعد، یا اگر آپ کو سنگین انفیکشن، سنگین طبی بیماری یا کسی بڑی سرجری کے لئے ہسپتال داخل کرنا گیا ہے تو، آپ کا ڈاکٹر آپ کی INVOKANA® موقوف کر سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ INVOKANA® کب موقوف رکھنا ہے اور اسے دوبارہ کب شروع کرنا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے خون یا پیشاب میں کیونز کی جانچ کرے گا۔

INVOKANA® چکر آنے یا پریشان دماغی کا سبب بن سکتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ دوا آپ کو کس طرح متاثر کرتی ہے تب تک گاڑی نہ چلائیں یا مشینری کا استعمال نہ کریں۔

**سنگین انتباہات اور احتیاطی تدابیر**

**(DKA)**

<< (DKA) ایک سنگین اور جان لیوا کیفیت ہے جس کے لئے فوری طور پر ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہے۔ DKA کی اطلاع خون میں شوگر کی معمول کی یا بلند سطحات والے، ٹائپ 2 ذیابیطس والے ان مریضوں میں ملی کہے جن کا علاج INVOKANA® کے ساتھ یا سوڈیم گلوکوز کو-ٹرانسپورٹ 2 اینیمیٹرز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ DKA کے چند واقعات موت پر منتج ہوئے ہیں۔

<< اگر آپ میں درج ذیل میں سے کوئی بھی علامات پائی جاتی ہیں (حتیٰ تک کہ اگر آپ کی بلڈ شوگر کی سطح معمول پر ہے): سانس لینے میں تکلیف، تھکی، پیٹ میں درد، بھوک میں کمی، الجھن، بہت پیاس لگنا، غیر معمولی طور پر تھکاوٹ یا نیند محسوس کرنا، سانس میں ایک میٹھی میٹھی سی خوشبو، منہ میں میٹھا یا دھاتی ذائقہ، یا پیشاب یا پسینے کی ایک مختلف بدبو ہو تو، فوری طور پر INVOKANA® لینا بند کریں فوری اور طبی امداد حاصل کریں۔

<< اگر ذیابیطس کی وجہ سے گردے کی بیماری کی تاریخ رکھتے رہتے ہوئے بھی آپ INVOKANA® استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو DKA کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے

<< ٹائپ 1 ذیابیطس والے مریضوں کو INVOKANA® استعمال نہیں کرنی چاہئے

<< INVOKANA® کا استعمال DKA کے علاج کے لیے نہیں کیا جانا چاہئے یا اگر آپ کی DKA کی کوئی تاریخ ہے

**جسم کے نچلے حصے کے اعضاء کا کٹنا**

<< INVOKANA® آپ کے جسم کے نچلے حصے کے اعضاء کے کٹنے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ قطع اعضاء میں بنیادی طور پر بیچوں یا ہیر کے ایک حصے کو کاٹنا شامل ہے لیکن اس میں ٹانگ، گھٹنے سے نیچے یا اوپر، بھی شامل ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اعضاء ایک سے زیادہ بار کٹے تھے، کچھ لوگوں کے جسم کے دونوں اطراف

<< اگر آپ کی ٹانگ یا ہیر میں نیا درد یا ملاہمت، کوئی زخم، السر یا انفیکشن ہے تو طبی امداد حاصل کریں۔ اگر آپ میں ان نشانیوں یا علامات مرض میں سے کوئی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر INVOKANA® کو روکنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے پاؤں کی مناسب نگہداشت اور اسے نم رکھنے کے بارے میں بات کریں

## اپنے نمبر جاننا

معمول کے ٹیسٹوں سے آپ اور آپ کے ڈاکٹر کو یہ دیکھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اور آیا کہ آپ کے طرز زندگی میں یا دواؤں میں تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

آپ کا ڈاکٹر خون میں شوگر کے ٹیسٹ یا قاعدگی کے ساتھ کروانے کی سفارش کر سکتا ہے، بشمول:

<b>A1c</b>	یہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے دوران آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول کی اوسط پیمائش ہے۔
<b>FPG</b>	آپ کا FPG (یا "فاسٹ پلازما گلوکوز") کھانے سے پہلے آپ کی بلڈ شوگر کی سطح ہے۔
<b>PPG</b>	آپ کا PPG (یا "کھانے کے بعد پلازما گلوکوز") آپ کی بلڈ شوگر کی سطح کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی ہے۔

اپنے بلڈ شوگر کے اہداف کے ذاتی بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور انہیں نیچے پر کریں:

PPG mmol/L	FPG mmol/L	A1c	
5.0 سے 10.0 تک (لیکن 5.0 تا 8.0 اگر A1c ہف پر نہیں ہے)	4.0 سے 7.0 تک	7.0% یا اس سے کم	زیادہ سے زیادہ ترمیموں کے لیے تجویز کردہ اہداف:
			میرے بلڈ شوگر کی سطح کے اہداف:

آپ کا ڈاکٹر eGFR ٹیسٹ کے ذریعے آپ کے گردے کے فعل کی جانچ کر سکتا ہے:

آپ کا eGFR (یا "تخمینہ شدہ گلوبولر فلٹریشن کی شرح") خون کی ایک جانچ ہے جو پیمائش کرتی ہے کہ آپ کے گردے کتنے اچھے طریقے سے اپنے خون فاضل مادوں کو فضلہ کو فلٹر کرنے کا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ eGFR چھتالم ہوگا، گردے اتنا ہی خراب کام کر رہے ہوں گے۔

اپنے گردے کے فعل کے موجودہ بارے میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اور ذیل میں بتائیں کہ eGFR کے تازہ ترین ٹیسٹ نے کیا ظاہر کیا ہے:

اس نتیجے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گردے کا کام:	میرا گزشتہ eGFR نتیجہ: _____	eGFR ریفرنس کی حد (mL/min/1.73 m)
نازل (گردے کو نقصان پہنچنے کی دیکھ بھال کی علامات کی بنیاد پر DKD کی تشخیص)	<input type="checkbox"/>	<90
قدرے نقصان ہوا ہے	<input type="checkbox"/>	60-89
اعتدال میں کمی واقع ہوئی	<input type="checkbox"/>	30-59
زیادہ نقصان ہوا ہے	<input type="checkbox"/>	15-29
اسے گردے کی ناکامی یا آخری مرحلے پر گردوں کی بیماری کہا جاتا ہے۔	<input type="checkbox"/>	>15

## دیگر ٹیسٹ

اپنے ڈاکٹر سے دوسرے ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں جن کی وہ سفارش کر سکتے ہیں، جیسے وہ جانچ پڑتال کریں  
 بلڈ پریشر  کو لیٹرول کی سطح  دیگر: \_\_\_\_\_

## میرے ٹیسٹ کے نتائج

اپنے ٹیسٹ کے نتائج کو ایک ملاقات سے دوسری ملاقات تک جاننے کے لیے اس جگہ کا استعمال کریں۔ یہ ریکارڈ آپ اور آپ کی صحت کی نگہداشت کرنے والی ٹیم کو بروقت آپ کے حالات کے بارے میں جاننے میں مدد فراہم کرتا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ کے علاج معالجے کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

دیگر جانچوں کے نتائج	eGFR نتائج ( <sup>2</sup> mL/min/1.73 m)	Atc نتائج (%)	تاریخ
BP بلڈ پریشر: mmHg 120/80	64	6.9	8 اپریل

نوٹس:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ایام مرض کا انتظام

اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور جسم میں یابی کی مقدار برقرار رکھنے کے لیے وافر مقدار میں سیال نہیں پی یا رہے ہیں تو، آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے سے بات کرنی چاہئے اور اس کے لئے ایک منصوبہ بنانا چاہئے کہ کیا کرنا ہے، بشمول کچھ ادویات عارضی طور پر روک دینے کا امکان۔

اگر آپ بیمار ہو جائیں تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے کے ساتھ ایام مرض کا انتظامی پلان تیار کریں۔


اس جگہ کا استعمال اپنی دوائیوں کی فہرست کے لیے کریں اور اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا کریں:

دوا	عمل

بغیر نسخے کے فروخت ہونے والی ادویات استعمال کرنے سے پہلے براہ کرم اپنے فارماسٹ سے پوچھ لیں اور اپنی ادویات میں ہونے والی تمام تبدیلیوں پر اپنے نگہداشتِ صحت کے ماہر سے تبادلہ خیال کریں۔

ناپ 2 زیائٹس یا زیائٹس کی وجہ سے گروے کی بیماری سے متعلق مزید معلومات کے لئے ملاحظہ کریں:

<http://guidelines.diabetes.ca/patient-resources>



**Invokana**  
canagliflozin tablets

دکھائی گئی تصاویر میں باڈیز شامل ہیں اور وہ صرف دماغی مقاصد کے لئے استعمال ہو رہے ہیں۔  
باہر کے دیگر تمام لوگوں کے مارک جات ان کے متعلقہ ماکان کے مارک جات ہیں۔

Janssen Inc. 19 Green Belt Drive | Toronto, Ontario | M3C 1L9 | [www.janssen.com/canada](http://www.janssen.com/canada)

© 2021 Janssen Inc.  
تمام مارک جات لائسنس کے تحت استعمال کردہ۔  
CP-205029Z

MEMBER OF  
INNOVATIVE MEDICINES CANADA

**Janssen**